

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICILES**

## DES PAYS DE LA LOIRE

**Tel. 88-30-34**

**88-06-15**

**ABONNEMENT ANNUEL**(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE ~~X~~~~O~~~~O~~~~X~~ VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE) MAYENNE**Poste 571**[illegible]

**XBXBX**

C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars

## ANGERS

**25 F.**

BULLETIN N° 94 DE JUILLET 1968 - MAINE-et-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE ..... P 30

## A - MALADIES CRYPTOGANIQUES

C'est le parasite occasionnant les plus graves dégâts sur les cassi-  
siers dans nos régions.

Les feuilles des extrémités des pousses de l'année sont d'abord recouvertes par un feutrage blanc grisâtre.

La maladie progresse et gagne toutes les tiges. En fin de saison, celles-ci sont desséchées sur 5 à 20 centimètres, diminuant ainsi très fortement la récolte prochaine.

Les essais de lutte effectués en 1977 ont permis de mettre en valeur la bonne protection assurée par 10 à 12 traitements effectués tous les 15 jours, depuis l'apparition des boutons floraux jusqu'en septembre, à l'aide du Chinométhionate et du Dinocap.

Le soufre est également efficace, mais provoque des brûlures dès que la température dépasse 20°.

Cette maladie, fréquente dans toutes les cultures, se manifeste sur le feuillage dès le mois de mai par la présence de petites taches brunes, au contour irrégulier de 1 à 3 mm environ. L'évolution est rapide en année humide et les feuilles tombent prématurément.

Elle se manifeste en général tardivement (en juillet-août) et seulement dans quelques cultures. Des pustules orangées apparaissent à la face inférieure des feuilles qui se dessèchent et tombent. Contre l'anthracnose et la rouille, on ajoutera à chaque traitement contre l'oïdium un produit organique de synthèse : mancozèbe, zinèbe, thirame, manèbe, zirame etc...

On observe parfois dans les plantations des dépérissements de tiges qui sont occasionnés par divers champignons, polypores, phomopsis, etc.. Leur installation se fait souvent par la plaie de taille. Les rameaux desséchés seront éliminés et la plaie de taille cicatrisée par un mastic approprié.

Des traitements d'hiver aux huiles d'antracène seront ensuite effectués (à suivre).

D. GRILL - Contrôleur de la Protection des Végétaux.

...../.....

VIGNE

AVERTISSEMENTS

MILDIU - Dans l'ensemble, la situation sanitaire des vignobles de Loire-Atlantique et du vignoble de Muscadet de Maine-et-Loire est bonne, et la récente élévation de température a provoqué la dessiccation des taches existantes. Cependant la végétation étant extrêmement rapide et la floraison se terminant, il est souhaitable d'envisager dans ces vignobles un traitement à la fin de la semaine en cours.

Dans les autres vignobles de Maine-et-Loire, attendre de prochaines informations.

L'Inspecteur de la Protection des  
Végétaux :

J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertisse-  
ments Agricoles : R. GEOFFRION  
J. BOUCHET.

TIRAGE DU 2 JUILLET 1968.